

AVERTISSEMENTS **GRICOLES** téléimprimés EDITION GRANDES CULTURES



STATION
 POITOU-CHARENTES

BIBLN
 11003 03005 00097 3172A 21/06/94-17h U
 BIBLIOTHEQUE NATIONALE
 REGIE DEPOT LEGAL
 PERIODIQUES - SERVICE IMPRIMERIE
 58, RUE RICHELIEU

Bulletin n° 267 (16/94) du 21 juin 1994

75000 PARIS

TOURNESOL : Très peu de contaminations phomopsis en Juin
 MAIS : Nos préconisations pyrale
 : Premiers dégâts de sésamie

TOURNESOL

Stade B6 à E3 (bouton de 3 à 5 cm).

PUCERONS

Situation

Régression généralisée de ce ravageur suite à l'action des auxiliaires.

Préconisation

Plus aucune intervention quel que soit le stade.

SCLEROTINIA DU BOURGEON TERMINAL

Situation - Préconisation

Climat très défavorable, contaminations impossibles. Les rares symptômes observés sur variétés sensibles ne progressent pas. Aucune intervention.

PHOMOPSIS

Situation

La maturation du champignon a maintenant atteint 70 %. Toutefois, la météo actuelle ne permet plus ni projection, ni contamination depuis le 4 Juin.

Préconisation

Secteur à risque "Nord Vienne" :

Si le traitement sur variétés sensibles n'a pas encore été effectué, attendre maintenant le stade limite de passage du tracteur pour intervenir. Sur variétés peu sensibles, ne pas intervenir sauf en présence de phases favorables aux contaminations avant le stade limite de passage (ces périodes seront signalées par message urgent).

. Autres secteurs à risque :

Se conformer aux préconisations ci-dessus.

. Secteurs à risque faible : pas d'intervention.

Conseil produit : l'action préventive des triazoles sera suffisante si vous intervenez avant les éventuelles prochaines pluies contaminantes.

Dans le cas contraire, l'action curative d'une morphine sera souhaitable.

MAIS

Stade 6 à 12 feuilles.

PYRALE

Situation

Depuis une semaine, la nymphose a nettement progressé dans la cage de Biard et atteint 36 %. Le vol se poursuit en tous secteurs ; aucune ponte n'a été observée à ce jour malgré un début de vol précoce.

Préconisation

Le traitement devant permettre de couvrir la plus grande partie de la période d'éclosion, l'intervention est à prévoir du 4 au 15 juillet dans les zones à risque (Avertel page 69).

Au cas où les températures de la prochaine décade seraient très inférieures aux Normales, cette période pourrait être décalée de quelques jours.

Il est rappelé qu'un risque de pullulation de pucerons existe lors de l'utilisation de pyrèthrinolides liquides.

SESAMIE

Situation

Le vol de la 1ère génération se termine. Les premiers dégâts sont signalés en parcelles non traitées en Charente-Maritime.

Préconisation

Les applications en simple intervention doivent être terminées. Celles en double application s'achèvent.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
 SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
 13, Rte de la forêt - 86580 BIARD
 Abonnement annuel: 350 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique
 Directeur Gérant: G. GOARANT
 CPPAP no. 1664 A.D.
 ISSN 0294 - 4693

P 73